IMF

IMAGERIE MOLÉCULAIRE
& FONCTIONNELLE



SCINTIGRAPHIE DU GANGLION SENTINELLE

FICHE D'INFORMATION

SECRÉTARIAT : 01 48 20 04 33 – FAX : 01 42 43 00 74
www.groupe-imf.com – contact@groupe-imf.com

QU'EST-CE QU'UNE SCINTIGRAPHIE DU GANGLION SENTINELLE ?

- Pour savoir si un **cancer du sein** s'est propagé dans les ganglions de l'aisselle, il faut habituellement les retirer lors de l'opération chirurgicale : c'est le «curage axillaire».
- Dans certains cas, il n'est cependant pas nécessaire de devoir tous les retirer: le chirurgien ne va enlever que les ganglions les plus proches de la tumeur : c'est la procédure du **ganglion sentinelle**.
- Si l'analyse microscopique de ces ganglions sentinelles ne retrouve pas de cellule cancéreuse, le chirurgien ne retirera pas les autres ganglions de l'aisselle.
- Pour repérer les ganglions sentinelles, on injecte un traceur qui diffuse dans les ganglions. En aucun cas la scintigraphie du ganglion sentinelle ne va détecter la présence ou non de cellules cancéreuses dans ces ganglions. Elle permet simplement d'**aider** le chirurgien à bien **repérer le ou les ganglions sentinelles**.
- Les images sont réalisées sur un appareil de scintigraphie appelé gamma-caméra ou scintiscanner, **sans risque de claustrophobie**.
- Le traceur utilisé est composé de sérum albumine humaine, dérivés de produits sanguins, marqués par le 99mTechnétium.

QUELLES SONT LES CONSIGNES POUR CET EXAMEN ?

- Signalez-nous si vous êtes **enceinte**, susceptible de l'être ou que vous **allaitez**.

N'OUBLIEZ PAS D'APPORTER

- Votre **carte vitale et votre attestation mutuelle.**
- La demande de votre médecin et vos **courriers médicaux**.
- Vos anciens **examens** (échographies, IRM, scintigraphies, scanners).

UNE FOIS L'EXAMEN TERMINÉ

- Aucune mesure d'éviction n'est recommandée pour l'entourage, y-compris pour les enfants et les femmes enceintes.
- Le traceur utilisé en scintigraphie ne provoque aucun effet secondaire et aucun risque d'allergie.

DÉCOUVREZ PAS À PAS
LES ÉTAPES DE VOTRE EXAMEN

ARRIVÉE DANS LE SERVICE
formalités administratives

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN

INJECTION PAR LE MÉDECIN DU TRACEUR EN DEUX INJECTIONS SOUS LA PEAU AUTOUR DE L'ARÉOLE DU SEIN
Pas d'allergie
Sensation de picotement possible

Attente d'une durée de 2 heures nécessaire à la migration du traceur dans les ganglions de l'aisselle

RÉALISATION DES IMAGES DE SCINTIGRAPHIE
Aide à localiser le ganglion sentinelle
Durée des images = 20 minutes

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN

RÉSULTATS REMIS EN MAINS PROPRES
TRANSMISSION DES RÉSULTATS AU MÉDECIN PRESCPRITEUR
Durée totale du parcours = 3 heures



IMF IMAGERIE MÉTABOLIQUE & FONCTIONNELLE

SERVICE DE SCINTIGRAPHIE- TEP
CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

IMF IMAGERIE MÉTABOLIQUE & FONCTIONNELLE

SERVICE DE SCINTIGRAPHIE- TEP
HOPITAL DELAFONTAINE

PLAN D'ACCÈS

SERVICE DE SCINTIGRAPHIE – TEP CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

32-36 Rue des Moulins Gémeaux
93200 Saint-Denis

PARKING
3, rue de la Poterie 93200 Saint-Denis
Parking sécurisé du CCN à proximité, gardienné et surveillé 7j/7 et 24h/24
Payant (uniquement par carte bancaire)

TRAIN
Gare de Saint-Denis: RER D ou ligne H, puis tramway T8 arrêt Paul Eluard

TRAMWAY
Tramway T8 : arrêt Paul Eluard
Tramway T1: arrêt Gérard Philippe

BUS
Lignes 154, 168, 170, 177, 178, 255, 268, 361

MÉTRO
Ligne 13: arrêt Saint-Denis Porte de Paris puis tramway T8 arrêt Paul Eluard

SERVICE DE SCINTIGRAPHIE – TEP HÔPITAL DELAFONTAINE

2 rue du Docteur Delafontaine
93200 Saint-Denis

PARKING
Parking de l'hôpital

TRAIN
Gare de Saint-Denis: RER D ou ligne H, puis tramway T1 arrêt Hôpital Delafontaine

TRAMWAY
Tramway T1 : arrêt Hôpital Delafontaine

BUS
Lignes 154, 253, 254

MÉTRO
Ligne 13: arrêt Saint-Denis Basilique puis tramway T1 arrêt Hôpital Delafontaine
Ligne 7: arrêt La Courneuve 8 mai 45 puis tramway T1 arrêt Hôpital Delafontaine

COORDONNÉES

Secrétariat : 01 48 20 04 33 – Fax : 01 42 43 00 74
www.groupe-imf.com – contact@groupe-imf.com